

KOLONOSKOPIA – PRZYGOTOWANIE DO BADANIA Z PREPARATEM CITRAFLEET BADANIE PO POŁUDNIU

Pięć dni przed planowanym badaniem:

Na 5 dni przed badaniem nie należy spożywać świeżych owoców i warzyw zawierających drobne pestki np. winogrona, pomidory, kiwi, truskawki oraz pestek, siemienia lnianego i maku. Pestki i nasiona mogą przykleić się do powierzchni jelita i utrudniać ocenę w trakcie badania.

Trzy dni przed planowanym badaniem:

Nie należy spożywać produktów zawierających drobne pestki np. winogrona, pomidory, kiwi, truskawki oraz pestek, siemienia lnianego i maku. Pestki i nasiona mogą przykleić się do powierzchni jelita i utrudniać ocenę w trakcie badania.

Zalecana jest dieta półpłynna np. zupy, soki, papki.

Zalecana jest dieta lekkostrawna bez świeżych owoców, warzyw, ciemnego pieczywa i innych produktów z dużą zawartością błonnika.

Dzień przed badaniem:

Około godziny 20.00 należy rozpuścić zawartość 1 saszetki w ok. 150 ml (filiżanka) niegazowanej zimniej wody, mieszając 2-3 minuty. Powstanie mętny roztwór. Wypij go niezwłocznie.

Ważne! Wypij dodatkowo 2 -3 litry niegazowanych napojów np. wody, herbaty, kompotu.

Do południa dieta bez mleka, płynna – kisiel, rosół.

Nie należy pić soków owocowych i napojów gazowanych.

Od godziny ok. 14.00 nie należy spożywać już żadnych posiłków. Można natomiast ssać landrynki, pić wodę, herbatę, soki niegazowane, kompot.

W dniu badania:

Około godz. 5.00 należy rozpuścić kolejną zawartość 1 saszetki w ok. 150 ml (filiżanka) niegazowanej zimniej wody, mieszając 2-3 minuty i wypij go niezwłocznie !!

Ważne! Wypij dodatkowo 2 -3 litry niegazowanych napojów .

JEŚLI BADANIE JEST W ZNIECZULENIU OGÓLNYM PROSZĘ 6 GODZ. PRZED POZOSTAĆ NA CZCZO.

Badanie w znieczuleniu ogólnym:

Po podaniu dożylnie środka usypiającego, pacjent zasypia na kilkanaście minut.

Podczas tego stanu lekarz przeprowadza badanie. Lekarz anestezyjolog po zakończeniu badania zaleci dietę lekkostrawną. Badanie wykonywane w znieczuleniu ogólnym, wymaga obecności osoby towarzyszącej, która odbierze pacjenta po ok. 2 godz. od momentu rozpoczęcia badania.

Nie można prowadzić pojazdów przez ok. 12 godz. po znieczuleniu.

Znieczulenie ogólne do badania należy odwołać najpóźniej na 2 dzień przed zabiegiem.